

Sur l'irréductibilité d'une classe des polynômes, I.

Par K. GYÖRÝ (Debrecen)

A la mémoire de I. Seres

Introduction

I. SCHUR a conjecturé [10], [2] que si $f(x) = \prod_{i=1}^m (x-a_i)$ est un polynôme avec des entiers différents a_i , alors $(f(x))^{2^n} + 1$ est irréductible sur le corps rationnel $\mathbb{Q}$ (sauf pour $n=0$, $m \leq 4$). Cette conjecture a été prouvée pour $n=0$ par W. FLÜGEL [4], pour $n=1$ dans le livre de G. PÓLYA et G. SZEGŐ [9], pour $n=2$ par H. ILLE [7] et pour $n \leq 3$, dans une forme plus générale, par A. BRAUER, R. BRAUER et H. HOPF [1]. Dans [1] les auteurs ont posé la question de l'irréductibilité des polynômes de la forme $g(f(x))$ généralement, les $f(x)$ étant des polynômes du type précédent. Pour des polynômes $g(x)$ de degré ≤ 3 et pour certains polynômes $g(x)$ du quatrième et sixième degré ils ont résolu le problème, en montrant que si $g(x)$ est fixé et irréductible, alors $g(f(x))$ est également irréductible sur $\mathbb{Q}$, sauf pour un nombre fini de polynômes $f(x)$ essentiellement différents (du point de vue de l'irréductibilité $f(x)$ et $f(x+a)$ ne sont pas essentiellement différents), et toutes les exceptions peuvent être déterminées. Pour des polynômes linéaires $g(x)$ cette proposition s'obtient déjà d'un théorème général de G. PÓLYA [8]. H. L. DORWART et O. ORE [3] ont obtenu des résultats analogues pour certains polynômes $g(x)$ du deuxième et du quatrième degré et pour des polynômes $f(x)$ ayant des racines entières différentes dans un corps quadratique imaginaire. U. WEGNER [15] a prouvé que si $g(x) = x^4 + d$, $d > 0$ entier et $d \not\equiv 3 \pmod{4}$, et si $f(x)$ est de la forme précédente avec $m > 5$, alors $g(f(x))$ est irréductible. Les méthodes, utilisées dans les travaux cités, ne peuvent pas être appliquées dans le cas de polynômes $g(x)$ de degré supérieur.

En utilisant le théorème de Kronecker concernant les unités des corps cyclotomiques, I. SERES [11], [12] a démontré que si les racines de $g(x)$ sont des unités non réelles d'un corps cyclotomique et si $f(x)$ a plus de $\max\left(\frac{\deg f}{2}, 5\right)$ racines entières différentes, alors $g(f(x))$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. De plus, pour des polynômes cyclotomiques $g(x)$ I. SERES [13] a déterminé tous les polynômes exceptionnels de la forme $f(x) = \prod_{i=1}^m (x-a_i)$ avec des entiers différents a_i pour lesquels $g(f(x))$ est réductible. Il a prouvé que dans ce cas $g(f(x))$ est réductible sur $\mathbb{Q}$ si et seulement

si l'on a $g(x) = x^4 - x^2 + 1$ et $f(x) = (x+a)(x+a+1)(x+a+2)$. Avec cela I. Seres a démontré la conjecture de I. Schur dans une forme plus générale.

Dans la suite nous traitons le problème de Brauer—Hopf dans le cas plus général où les racines de $f(x)$ ne sont pas nécessairement entières mais il y a un polynôme normé $f_1(x) \mid f(x)$ à coefficients entiers ayant des racines réelles différentes, et le corps de décomposition de $g(x)$ est non réel tel que son sous-corps réel maximal est normal sur $\mathbb{Q}$ (voir 2.). Soit L le corps de décomposition de $f_1(x)g(x)$. En développant progressivement la méthode de I. Seres et en utilisant les inégalités de norme (1), (2) et (3), nous prouvons, entre autres, que si des paires (α_i, α_k) des racines de $f_1(x)$, satisfaisant à $N_{L/\mathbb{Q}}(\alpha_i - \alpha_k) > \{2^n g^2(0)\}^{[L:\mathbb{Q}]/n}$ ($n = \deg g$) forment un graphe connexe à s éléments, alors les degrés des facteurs irréductibles de $g(f(x))$ sur $\mathbb{Q}$ sont $\cong sn$ et par conséquent le nombre de ses diviseurs irréductibles est $\cong \frac{\deg f}{s}$. Nous démontrons cette proposition dans une forme p -adique. Il en résulte immédiatement, par exemple, que si les racines de $f(x)$ sont réelles et différentes et si pour ses racines on a $\min_{i \neq k} |\alpha_i - \alpha_k| > 2 \{g(0)\}^{2/n}$, alors $g(f(x))$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Nous remarquons qu'on ne peut pas étendre ces résultats aux polynômes arbitraires $f(x)$ et $g(x)$. En utilisant que $g(x) \mid g(x+h(x)g(x))$, on peut construire des polynômes $f(x)$ et $g(x)$, satisfaisant aux conditions de nos théorèmes sauf que le corps de décomposition de $g(x)$ soit un corps non réel du type précédent ou les racines de $f(x)$ soient des nombres réels différents, pour lesquels $g(f(x))$ est réductible sur $\mathbb{Q}$ (voir 3.).

De nos résultats mentionnés on déduit la solution du problème original de Brauer—Hopf pour chaque $g(x)$ et nous obtenons une généralisation des théorèmes cités de I. SERES [11], [12]. De plus, nous résolvons plusieurs problèmes diophantiens et nous déterminons tous les polynômes exceptionnels $f(x)$, $g(x)$ pour lesquels $g(0)=1$, $f(x) = \prod_{i=1}^m (x-a_i)$ avec des entiers différents a_i et $g(f(x))$ est réductible, en généralisant le résultat cité de I. SERES [13] concernant le problème de I. Schur. Dans [6] et dans la partie II. nous donnons plusieurs autres applications et extensions de nos résultats. Par exemple, en considérant tous les polynômes $f(x)$ ayant des racines différentes dans un corps réel fixé, nous prouvons la généralisation du problème de Brauer—Hopf pour chaque $g(x)$ et nous donnons la solutions de ce problème pour chaque $g(x)$ aussi dans le cas où le degré des polynômes $f(x)$ ayant des racines différentes réelles est fixé.

2. Résultats préliminaires

Les corps algébriques satisfaisants à la condition (a) $\Leftrightarrow$ (b) sont souvent utilisés dans la théorie des nombres. Nous appelons ces corps kroneckeriens ou simplement des K -corps, puisque on peut étendre à leurs unités le théorème de Kronecker concernant les unités des corps cyclotomiques.*) Nous étudions ces corps et leurs

*) Le 31 octobre 1971 Prof. A. SCHINZEL m'a informé que dans le cas spécial $S = S_\infty$ (a) $\Leftrightarrow$ (c) est démontré par R. REMAK (*Comp. Math.* 10 (1952), 245—285)

applications en détail dans [6], ici nous énumérons seulement nos résultats, utilisés dans la suite.

Soit L_0 le sous-corps maximal réel du corps algébrique L et soit $L\psi$ ou $\bar{L}$ le corps conjugué complexe de L dans le corps complexe. Si S^0 est un système de valuations non équivalentes de L_0 , alors désignons par S le système de toutes les continuations de ces valuations dans L . Enfin soit S_∞ le système des valuations archimédiennes non équivalentes de L .

Théorème. Pour un corps algébrique L les assertions suivantes sont équivalentes:

(a) L est totalement réel ou bien une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel (c'est-à-dire $L = L_0(\sqrt{-\mu})$, où $\mu \in \mathbb{L}_0$ est totalement positif).

(b) $L\psi = L$ et $\sigma\psi = \psi\sigma$ pour chaque isomorphisme σ de L dans le corps complexe.

(c) $L = L_0$ est totalement réel ou bien $L \neq L_0$. Dans ce cas soit $S \supseteq S_\infty$ un système de valuations de L tel que chaque valuation de $S^0 \setminus S_\infty^0$ ait continuation unique dans L . Désignons par V , U_s et U_s^0 le groupe des racines d'unité, le groupe des S -unités et le groupe des S -unités réelles dans L respectivement. Alors $U_s / \{V, U_s^0\}$ est fini et dans le cas spécial $S = S_\infty$ on a $[U_s : \{V, U_s^0\}] \leq 2$.

(d) Il existe un corps algébrique $F \supseteq L$ tel que F/Q et F_0/Q sont normales.*)

Dans [5] nous avons appelé les corps algébriques à propriété (d) „allowed”.

Lemme 1. Les sous-corps, les intersections et les compositions de K -corps sont également de K -corps dans le corps complexe.

Dans la suite soit L un K -corps. Alors α et $\bar{\alpha}$ appartiennent simultanément à L , et par conséquent $\operatorname{Re} \alpha, i \operatorname{Im} \alpha \in L$. Si φ est une valuation normée non archimédienne dans L , alors $\bar{\varphi}(\alpha) = \varphi(\bar{\alpha})$ est également une valuation normée non archimédienne dans L . Nous appelons φ simplement „réelle”, si l'on a $\bar{\varphi}(\alpha) = \varphi(\alpha)$ pour chaque $\alpha \in L$, dans le cas contraire soit φ appelé „non réelle”.

Nous avons trouvé l'inégalité suivante en collaboration avec L. Lovász [5] dans la forme $|N_{F/Q}(\alpha)| \equiv |N_{F/Q}(\operatorname{Re} \alpha)|, |N_{F/Q}(i \operatorname{Im} \alpha)|$, où F désigne un corps galoisien à propriété (d).

Lemme 2. Soit L un K -corps de degré n , et soient S_1 et S_2 des systèmes de ses valuations normées non archimédiennes „réelles” et „non réelles” respectivement. Alors pour tout $\alpha \in L$ on a

$$\begin{aligned} & \{N_{L/Q}(\alpha) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\alpha) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\alpha), \varphi(\bar{\alpha}))\}^{2/n} \equiv \\ (1) \quad & \equiv \{ \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(2) \}^{2/n} [\{N_{L/Q}(\operatorname{Re} \alpha) \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(\operatorname{Re} \alpha)\}^{2/n} + \\ & + \{N_{L/Q}(i \operatorname{Im} \alpha) \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(i \operatorname{Im} \alpha)\}^{2/n}] \end{aligned}$$

et en particulier dans le cas $S_1, S_2 = \emptyset$

$$(2) \quad N_{L/Q}^{2/n}(\alpha) \equiv N_{L/Q}^{2/n}(\operatorname{Re} \alpha) + N_{L/Q}^{2/n}(i \operatorname{Im} \alpha).$$

*) Si le corps algébrique L est donné par le polynôme caractéristique $g(x)$ d'un élément primitif de L , on peut décider à l'aide d'un algorithme si L est kroneckerien ou non (voir, par ex. [6]).

On peut aisément donner (1) aussi dans une forme p -adique (voir par exemple le théorème 1').

Lemme 3. *Si L est un K -corps non réel et si $\alpha, \beta \in L$ sont des entiers non réels et non purement imaginaires tels que $\alpha \pm \beta$ est réel ou purement imaginaire, alors on a*

$$(3) \quad N_{L/Q} \left(\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \equiv N_{L/Q}(\alpha\beta) \equiv \frac{N_{L/Q}^2(\alpha) + N_{L/Q}^2(\beta)}{2}$$

Dans la suite soit L un K -corps normal non réel sur Q et soit P un idéal premier dans l'anneau des entiers de L . Nous appelons P „réel”, si son groupe de décomposition contient la conjugation complexe (c'est-à-dire la valuation φ_P est „réelle”), dans le cas contraire P soit appelé „non réel”. Appelons le nombre premier rationnel p „réel” ou „non réel” dans L , si tous les idéaux premiers $P|p$ sont „réels” ou bien „non réels” dans L .

Lemme 4. *Dans L chaque nombre premier rationnel p est ou „réel” ou „non réel” et le nombre des premiers „réels” dans L est infini.*

Par conséquent dans un K -corps non réel il y a une infinité de valuations non équivalentes „réelles”. Dans les corps abéliens on peut aisément caractériser les premiers „réels” à l'aide de la théorie du corps de classes.

Lemme 5. *Si $L = L_0(\sqrt{-\mu})$ ($\mu \in L_0$ est un entier totalement positif) est normal sur Q et si p est un nombre premier rationnel tel que $p \nmid 2D_{L/Q}$, $p \nmid N_{L_0/Q}(-\mu)$, alors p est „réel” dans L si et seulement si $-\mu$ est un quadratique non-résidu (mod p) dans L_0 . Par conséquent, si $N_{L_0/Q}(-\mu)$ est un quadratique non-résidu (mod p), alors p est „réel” dans L .*

3. Résultats

a) Irréductibilité des polynômes sur K -corps non réels

Dans la suite soit L un K -corps non réel, S_1 et S_2 des systèmes de valuations normées non archimédiennes „réelles” et „non réelles” respectivement. Si $f(x) = \beta_0 x^k + \dots + \beta_k \in L[x]$ et $\operatorname{Re} f(x) = \operatorname{Re} \beta_0 x^k + \dots + \operatorname{Re} \beta_k$, $i \operatorname{Im} f(x) = i \operatorname{Im} \beta_0 x^k + \dots + i \operatorname{Im} \beta_k$, alors on a $\operatorname{Re} f(x), i \operatorname{Im} f(x) \in L[x]$. De plus, si $f(x)$ est irréductible sur L et non réel, alors on a nécessairement $(\operatorname{Re} f(x), i \operatorname{Im} f(x)) = 1$.

Théorème 1. *Soit $f(x) \in L[x]$ normé avec des coefficients entiers tel que $(\operatorname{Re} f(x), i \operatorname{Im} f(x)) = 1$. S'ils existent des entiers réels α_i dans L tels que pour des paires (α_i, α_k) convenablement choisies*

$$(4) \quad \begin{aligned} & N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) > \\ & > 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(f(\alpha_i)f(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(f(\alpha_i)f(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(f(\alpha_i) \times \\ & \quad \times \overline{f(\alpha_k)}), \varphi(\overline{f(\alpha_i)}f(\alpha_k))) > 0 \end{aligned}$$

et si ces paires forment un graphe connexe à s éléments, alors $f(x)$ n'a aucun diviseur

irréductible de degré $< s^*$) sur L . Par conséquent, si $s > \frac{\deg f}{2}$, alors $f(x)$ est irréductible sur L .

En choisissant convenablement les α_i , α et $f_1(x)$, les polynômes de la forme $f(x) = f_1(x) \prod_{i=1}^s (x - \alpha_i) + \alpha$, par exemple, satisfont aux conditions du théorème.

Nous remarquons qu'on ne peut pas étendre le théorème aux K -corps réels. Soit, par exemple, L un corps quadratique réel et soit $\varepsilon > 1$ son unité fondamentale. Si maintenant n est un nombre naturel „grand” et $f(x) = x[(x-1)(x-\varepsilon^n) + (\varepsilon-1)\varepsilon^n]$, alors $N_{L/Q}^2(1-\varepsilon^n)$ et $N_{L/Q}^2(\varepsilon^n-\varepsilon)$ sont „grands”, $N_{L/Q}^2(f(1)) = N_{L/Q}^2(f(\varepsilon)) = N_{L/Q}^2(f(\varepsilon^n)) = N_{L/Q}^2(1-\varepsilon)$ sont „petits” et $f(x)$ est réductible sur L .

Dans le cas de polynômes spéciaux on peut encore un peu améliorer le théorème 1.

Théorème 2. Soit $f(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i) + \alpha$, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ et α étant des entiers réels et non réels dans L respectivement. Si pour des paires (α_i, α_k) convenablement choisies on a

$$(5) \quad N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}(\alpha \bar{\alpha}) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\alpha \bar{\alpha}) > 0$$

et si ces paires forment un graphe connexe à m éléments**), alors $f(x)$ est irréductible sur L .

b) Irréductibilité des polynômes sur Q .

Dans la suite soient $f(x)$ et $g(x)$ des polynômes à coefficients entiers rationnels. Pour que $g(f(x))$ soit irréductible sur Q il faut que $g(x)$ soit également irréductible sur Q . De plus, évidemment on peut se réduire aux polynômes normés. Dans la suite soit $g(x)$ irréductible sur Q et soient $g(x)$ et $f(x)$ normés.

Dans ce point nous supposons que le corps de décomposition de $g(x)$ est un K -corps non réel et supposons qu'il existe un polynôme $f_1(x) | f(x)$ à coefficients entiers, ayant seulement des racines réelles différentes. Désignons par L le corps de décomposition de $f_1(x)g(x)$ et par $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ des systèmes convenablement formés (peut être vides) des nombres premiers rationnels „réels” et „non réels” dans L respectivement.

Théorème 1'. Si pour des paires (α_i, α_k) convenablement choisies des racines de $f_1(x)$ on a

$$(6) \quad N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{p \in \mathcal{P}_1} |N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k)|_p \prod_{p \in \mathcal{P}_2} |N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k)|_p > \\ > \{2^n g^2(0) \prod_{p \in S_1} |g^2(0)|_p \prod_{p \in \mathcal{P}_2} |g(0)|_p\}^{\frac{2[L:Q]}{n}}; \quad n = \deg g$$

*) En général, dans le théorème 1. et 1'. ces inégalités ne peuvent pas être déjà améliorées.

**) Addendum. Si les paires (α_i, α_k) satisfaisant à (5) (à (7)) forment un graphe connexe à s éléments, alors l'assertion du théorème 1 (1') est également vrai. Par conséquent nos théorèmes 1', 2', 3, 4 et 5 peuvent être encore améliorés.

et si ces paires forment un graphe connexe à s éléments, alors $g(f(x))$ n'a aucun diviseur irréductible de degré $< s \deg g$ sur Q , par conséquent le nombre de ses diviseurs irréductibles est $\equiv \frac{\deg f}{s}$ et en particulier de $s > \frac{\deg f}{2}$ il résulte l'irréductibilité de $g(f(x))$ sur Q .

Considérons maintenant le cas spécial où $f_1(x) = f(x)$.

Théorème 2'. Supposons que toutes les racines de $f(x)$ sont réelles et différentes. Si pour des paires (α_i, α_k) convenablement choisies des racines de $f(x)$ on a

$$(7) \quad N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{p \in P_1} |N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k)|_p > \{2^n g(0) \prod_{p \in P_1} |g(0)|_p\}^{\frac{[L:Q]}{n}}$$

et si ces paires forment un graphe connexe à $\deg f$ éléments**), alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q .

On peut bien appliquer les formes p -adiques ($\mathcal{P}_1$ ou $\mathcal{P}_2 \neq \emptyset$) des théorèmes 1' et 2' par exemple dans le cas où $g(0)$ est divisible par beaucoup de nombres premiers „réels”, premiers à $D(f_1)$ ou $D(f)$ respectivement. Par exemple, si les polynômes $f(x)$ et $g(x) = \Pi(x - \alpha)$ satisfont aux conditions du théorème 1' ou 2' et si dans $g^*(x) = \Pi(x - a\alpha)$ tous les diviseurs premiers de a sont „réels” et premiers à $D(f_1)$ ou $D(f)$, alors $g^*(f(x))$ est également irréductible. Dans le cas $g(x) = x^4 + 1$ il en résulte un théorème de U. WEGNER [15].

Nous remarquons qu'on peut appliquer les théorèmes 1'—6 aussi pour les autres substitutions entières x_0 ($x_0 = 0$ ou $x_0 \neq 0$), en supposant que $g(x_0)$ et les racines de $f(x) - x_0$ satisfont aux conditions. En effet, si $g^*(x) = g(x + x_0)$ et $f^*(x) = f(x) - x_0$, alors $g(f(x)) = g^*(f^*(x))$ est irréductible d'après nos théorèmes.

Dans la suite nous donnons quelques conséquences des théorèmes 1' et 2'.

Pour un polynôme $f(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i)$ à coefficients entiers avec le discriminant $D(f) \neq 0$ nous introduisons la notation

$$c(f) = \min_{i \neq j} |\alpha_i - \alpha_j|.$$

Théorème 3. Supposons que $\deg f_1 > \frac{\deg f}{2}$, $(D(f_1), p) = 1$ pour tout $p \in \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ et supposons qu'on a

$$(8) \quad c(f_1) > 2 \{g^2(0) \prod_{p \in P_1} |g^2(0)|_p \prod_{p \in P_1} |g(0)|_p\}^{1/n}, \quad n = \deg g$$

$$(9) \quad c(f) > 2 \{g(0) \prod_{p \in P_1} |g(0)|_p\}^{1/n}$$

selon que $f_1(x) \neq f(x)$ ou $f_1(x) = f(x)$. Alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q . Par conséquent si l'on a en particulier

$$(10) \quad c(f_1) > 2g^{2/n}(0) \quad \text{ou} \quad c(f) > 2g^{1/n}(0) \quad (f_1(x) = f(x)),$$

alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q .

Donc, pour un polynôme fixé $g(x)$ et pour une classe assez large des polynômes $f(x)$ on obtient l'irréductibilité de $g(f(x))$. D'un autre côté, fixons un polynôme normé $f(x)$ à coefficients entiers, ayant des racines réelles différentes. En supposant que le corps de décomposition d'un polynôme $g(x)$ est un K -corps non réel et $2\{g(0)\}^{1/\deg g} < c(f)$, de l'irréductibilité de $g(f(x))$ dans $Q[f(x)]$ il résulte son irréductibilité aussi dans $Q[x]$.

Nous remarquons qu'on ne peut pas étendre nos théorèmes 1', 2' et 3 aux polynômes arbitraires $f(x)$ et $g(x)$. Plus exactement on peut aisément construire des polynômes $f(x)$ et $g(x)$ pour lesquels le corps de décomposition de $g(x)$ n'est pas de K -corps non réel ou les racines de $f(x)$ ne sont pas tous réelles différentes, $f(x)$ et $g(x)$ satisfont aux conditions supplémentaires des théorèmes, pourtant $g(f(x))$ est réductible sur Q .

Pour construire des polynômes convenables, considérons, par exemple, un corps quadratique réel avec une unité fondamentale $\varepsilon > 1$ de norme $+1$ et soit n un nombre naturel „grand”. Alors $a = \varepsilon^n + \varepsilon^{-n}$ et $a' = \varepsilon^{2n} + \varepsilon^{-2n}$ sont des nombres naturels „grands”.

Prenons maintenant, par exemple, les polynômes $g(x) = x^2 - ax + 1 = (x - \varepsilon^n)(x - \varepsilon^{-n})$ et $f(x) = x + g(x) = x^2 - (a-1)x + 1 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)$ ayant des racines réelles différentes. Alors $N_{L/Q}(\alpha_1 - \alpha_2)$ et $|\alpha_1 - \alpha_2|$ sont „grands” par rapport à $2\{g(0)\}^{1/\deg g}$ et $2\{g(0)\}^{2/\deg g}$ respectivement, pourtant $g(x)|g(f(x))$, c'est-à-dire $g(f(x))$ est réductible sur Q .

D'autre part, considérons les polynômes $f(x) = x^4 + a'x^2 + 1 = (x - i\varepsilon^n) \cdot (x + i\varepsilon^n)(x - i\varepsilon^{-n})(x + i\varepsilon^{-n})$ et $g(x) = f(x) - x$ ayant des racines non réelles ($g(x)$ est irréductible sur Q). Alors on peut également vérifier que $g(x)$ et $f(x)$ satisfont aux conditions supplémentaires des théorèmes 1' et 2', mais $g(x)|g(f(x))$, c'est-à-dire $g(f(x))$ est réductible sur Q .

Du théorème 1' on obtient la généralisation suivante des théorèmes de I. Seres concernant les polynômes cyclotomiques $g(x)$ [11] et les polynômes minimales $g(x)$ des unités non réelles des corps cyclotomiques [12].

Théorème 4. Si $f(x)$ a plus de $\frac{\deg f}{2}$ racines entières différentes et si $\deg f \equiv \equiv 2[4\{g(0)\}^{2/\deg g} + 1]$, alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q .

Ensuite nous donnons la solution du problème original de Brauer—Hopf [1] pour tous les polynômes $g(x)$ ayant des corps de décomposition kroneckeriens non réels.

Théorème 5. Soit $f(x) = \prod_{i=1}^m (x - a_i)$ avec des entiers différents a_i . Alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q , sauf certains cas où $\max_{i \neq j} |a_i - a_j| \leq 4\{g(0)\}^{1/\deg g}$, c'est-à-dire $m \leq 4\{g(0)\}^{1/\deg g} + 1$. Par conséquent, pour $g(x)$ fixé il y a seulement un nombre fini de polynômes $f(x)$ essentiellement différents*) du type précédent tels que $g(f(x))$ est réductible sur Q et ces exceptions peuvent être déterminées.

*) Les polynômes $f(x)$ et $f(x+a)$ ne sont pas essentiellement différents du point de vue d'irréductibilité.

Enfin, en généralisant les résultats de I. Seres concernant les polynômes cyclotomiques $g(x)$ ([13]), nous déterminons tous les polynômes $f(x)$, $g(x)$ tels que $f(x) = \prod_{i=1}^m (x - a_i)$, $g(0)=1$ pour lesquels $g(f(x))$ est réductible. Pour démontrer ce théorème nous résolvons plusieurs problèmes diophantiens.

Théorème 6. Dans le théorème précédent soit $g(0)=1$ et désignons par ε une des racines de $g(x)$. Alors $g\left(\prod_{i=1}^m (x - a_i)\right)$ est réductible sur $\mathbb{Q}$ si et seulement si les a_i sont des entiers consécutifs et

$m=4$, $\varepsilon = \zeta^2 - 1$, où ζ est une racine d'unité primitive de degré n ou $2n$, $2 \nmid n$, $n \neq p^\alpha$ ($p \geq 3$ nombre premier, $\alpha \geq 0$).

$m=3$, $\varepsilon = \pm \zeta(1 - \zeta^2)$, où ζ est une racine d'unité primitive de degré $\neq p^\alpha$, $2p^\alpha$ ($p \geq 2$ nombre premier, $\alpha \geq 0$).

$m=2$, $\varepsilon = \frac{(1-\zeta_1)(1-\zeta_2)}{(\zeta_1-\zeta_2)^2}$, où $\zeta_1, \zeta_2 (\neq \zeta_1, \bar{\zeta}_1)$ ζ_1/ζ_2 sont des racines d'unité primitives de degré p^α simultanément (p nombre premier) ou bien aucun de leurs degrés n'est une puissance de premiers, et il n'y a aucune racine d'unité ζ de degré $q \neq p^\alpha$ ($p \geq 3$ nombre premier) telle que $\zeta_1 = \zeta^a$, $\zeta_2 = \zeta^b$, $\zeta_1^a = \zeta_2^b$ et $(a, q) = (b, q) = 1$,

ou $m=2$, $a_2 - a_1 = 2$, $\varepsilon = \zeta^2 - 1$, où ζ est une racine d'unité primitive de degré n ou $2n$, $2 \nmid n$, $n \neq p^\alpha$ ($p \geq 3$ nombre premier).

Si $m=3$ et ε est une racine d'unité, de notre théorème on obtient l'exception $g(x) = x^4 - x^2 + 1$, $f(x) = (x+a)(x+a+1)(x+a+2)$, donnée par I. Seres [13].

4. Démonstrations

Dans la suite soit L un K -corps non réel et soient S_1, S_2 des systèmes de ses valuations normées non archimédiennes „réelles” et „non réelles” respectivement.

Lemme 6. Si α, β sont entiers dans L et $\alpha|\beta$, alors les nombres ci-dessous sont entiers rationnels et on a

(11)

$$N_{L/Q}^2(\alpha) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\alpha), \varphi(\bar{\alpha})) | N_{L/Q}^2(\beta) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\beta) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\beta), \varphi(\bar{\beta}))$$

DÉMONSTRATION. Considérons les décompositions de α et β en produits d'idéaux premiers. Si l'on a $\varphi_P, \varphi_{\bar{P}} \in S_2$ pour chaque idéal premier „non réel” $P|\alpha$, alors notre proposition est évidente. Donc, soit $P|\alpha$ un idéal premier „non réel” tel que φ_P ou $\varphi_{\bar{P}} \in S_2$ et désignons par $a(P, \bar{P})$ et $a'(P, \bar{P})$ la somme des exposants de $N(P)$ et $N(\bar{P})$ dans le côté gauche et droit de (11) respectivement. Il suffit de montrer qu'on a $0 \leq a(P, \bar{P}) \leq a'(P, \bar{P})$. Supposons que $P^k \parallel \alpha$, $P^l \parallel \bar{\alpha} \Rightarrow \bar{P}^l \parallel \alpha$ et $P^{k'} \parallel \beta$, $P^{l'} \parallel \bar{\beta} \Rightarrow \bar{P}^{l'} \parallel \beta$, où $k \leq k'$, $l \leq l'$ d'après $\alpha|\beta$. Si maintenant φ_P et $\varphi_{\bar{P}} \in S_2$, alors on a $a(P, \bar{P}) = 2k + 2l - 2 \min(k, l)$, $a'(P, \bar{P}) = 2k' + 2l' - 2 \min(k', l')$, dans le cas contraire $a(P, \bar{P}) = 2k + 2l - \min(k, l)$, $a'(P, \bar{P}) = 2k' + 2l' - \min(k', l')$. L'inégalité nécessaire en résulte aisément dans tous les deux cas.

Lemme 7. Soit $\pi(x)$ un polynôme à coefficients entiers sur L et soient α_i, α_k des entiers réels dans L . Si l'on a

$$(12) \quad N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \times \\ \times \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\pi(\alpha_i)\overline{\pi(\alpha_k)}), \varphi(\overline{\pi(\alpha_i)}\pi(\alpha_k))) > 0,$$

alors

$$\overline{\pi(\alpha_i)} \cdot \pi^{-1}(\alpha_i) = \overline{\pi(\alpha_k)} \cdot \pi^{-1}(\alpha_k).$$

DÉMONSTRATION. D'après l'hypothèse

$$\alpha_i - \alpha_k | \pi(\alpha_i) - \pi(\alpha_k) \quad \text{et} \quad \alpha_i - \alpha_k | \overline{\pi(\alpha_i)} - \overline{\pi(\alpha_k)},$$

par conséquent

$$\alpha_i - \alpha_k | \pi(\alpha_i)\overline{\pi(\alpha_k)} - \overline{\pi(\alpha_i)}\pi(\alpha_k) = 2i \operatorname{Im} \pi(\alpha_i)\overline{\pi(\alpha_k)} = \gamma_{ik}.$$

Il en résulte

$$(13) \quad N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) | N_{L/Q}(\gamma_{ik}) \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(\gamma_{ik})$$

et

$$(14) \quad N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) | N_{L/Q}(\gamma_{ik}) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\gamma_{ik}).$$

En utilisant maintenant l'inégalité de norme (1), nous obtenons

$$(15) \quad N_{L/Q}(\gamma_{ik}) \prod_{\varphi \in S_1 \cup S_2} \varphi(\gamma_{ik}) \leq 2^{[L:Q]} N_{L/Q}(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \times \\ \times \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\pi(\alpha_i)\overline{\pi(\alpha_k)}), \varphi(\overline{\pi(\alpha_i)}\pi(\alpha_k)))$$

et

$$(16) \quad N_{L/Q}(\gamma_{ik}) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\gamma_{ik}) \leq 2^{[L:Q]} N_{L/Q}(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k))$$

Si l'on a $\gamma_{ik} \neq 0$, c'est-à-dire $\overline{\pi(\alpha_i)}\pi^{-1}(\alpha_i) \neq \overline{\pi(\alpha_k)}\pi^{-1}(\alpha_k)$, alors en comparant le produit de (13) et de (14) avec le produit de (15) et de (16), on déduit

$$N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) \leq 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \times \\ \times \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\pi(\alpha_i)\pi(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\pi(\alpha_i)\overline{\pi(\alpha_k)}), \varphi(\overline{\pi(\alpha_i)}\pi(\alpha_k))),$$

contrairement à l'hypothèse (12).

Lemme 8. Soit $\pi(x)$ un polynôme à coefficients entiers sur L . S'ils existent des entiers réels $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ($s > \deg \pi$) dans L tels que leurs paires (α_i, α_k) satisfaisant à (12) forment un graphe connexe à s éléments, alors on a $\overline{\pi(x)} = q\pi(x)$ avec un certain $q \in L$.

DÉMONSTRATION. Si le graphe des paires (α_i, α_k) satisfaisant à (12) est connexe, alors d'après le lemme 7, on déduit $\overline{\pi(\alpha_i)}\pi^{-1}(\alpha_i) = \varrho \in L$ ($i=1, \dots, s$). Soit

$$\pi(x) = \beta_0 x^k + \dots + \beta_k$$

et substituons les $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ dans $\pi(x)$. Alors du système d'équation obtenu il résulte

$$\beta_j = \sum_{l=1}^{k+1} \sigma_{jl} \pi(\alpha_l) \quad (j = 0, \dots, k)$$

avec des nombres réels $\sigma_{jl} \in L$. On en déduit nécessairement $\overline{\beta_j}/\beta_j = \varrho$ ($j=0, \dots, k$) c'est-à-dire $\overline{\pi(x)} = \varrho \pi(x)$.

Lemme 9. Soit $f(x)$ un polynôme sur L tel que $(\operatorname{Re} f(x), i \operatorname{Im} f(x)) = 1$. Alors $f(x)$ n'a aucun diviseur $\pi(x)$ du type $\overline{\pi(x)} = \varrho \pi(x)$ ($\varrho \in L$).

DÉMONSTRATION. Pour chaque diviseur $\pi(x)$ de $f(x)$ on a $\overline{\pi(x)} | \overline{f(x)}$ dans $L[x]$. Si l'on a maintenant $\overline{\pi(x)} = \varrho \pi(x)$ ($\varrho \in L$), alors on conclut $\pi(x) | f(x)$, $\pi(x) | f(x) \pm \pm \overline{f(x)}$, c'est-à-dire $\pi(x) | (\operatorname{Re} f(x), i \operatorname{Im} f(x))$ dans $L[x]$, ce qui est contraire à l'hypothèse.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 1. Supposons que $f(x)$ a un diviseur $\pi(x) \in L[x]$ à coefficients entiers de degré $< s$. Alors pour les paires convenables (α_i, α_k) on a $0 \neq \pi(\alpha_i) \overline{\pi(\alpha_k)} | f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)}$ d'après (4), c'est-à-dire $f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)} \neq 0$. En utilisant le lemme 6., de (4) il résulte

$$\begin{aligned} & N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)}) \times \\ & \times \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)}) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)}), \varphi(\overline{f(\alpha_i)} f(\alpha_k))) \cong \\ & \cong 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(\pi(\alpha_i) \overline{\pi(\alpha_k)}) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\pi(\alpha_i) \overline{\pi(\alpha_k)}) \times \\ & \times \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(\pi(\alpha_i) \overline{\pi(\alpha_k)}), \varphi(\overline{\pi(\alpha_i)} \pi(\alpha_k))) > 0. \end{aligned}$$

Mais par l'hypothèse le graphe de ces paires est connexe et elle a $s > \deg \pi$ éléments, ainsi d'après le lemme 8, on en déduit $\overline{\pi(x)} = \varrho \pi(x)$ avec une constante $\varrho \in L$, ce qui entraîne une contradiction d'après le lemme 9.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2. Supposons qu'il existe une décomposition

$$f(x) = \pi_1(x) \pi_2(x)$$

avec des polynômes $\pi_1(x), \pi_2(x)$ à coefficients entiers sur L . De $f(\alpha_k) = -\alpha \neq 0$ on déduit $\pi_1(\alpha_k) \pi_2(\alpha_k) \neq 0$ ($k=1, \dots, m$) et $\alpha \overline{\alpha} = f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)} = \pi_1(\alpha_i) \pi_2(\alpha_i) \overline{\pi_1(\alpha_k) \pi_2(\alpha_k)} = \pi_1(\alpha_i) \overline{\pi_1(\alpha_k)} \cdot \pi_2(\alpha_i) \overline{\pi_2(\alpha_k)}$. Mais $N_{L/Q}(\pi_j(\alpha_k)) = N_{L/Q}(\pi_j(\alpha_k))$ et $\varphi(\pi_j(\alpha_k)) = \varphi(\pi_j(\alpha_k))$

($j=1, 2$; $\varphi \in S_1$, $k=1, \dots, m$), par conséquent de (5) il résulte

$$N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}(\pi_1(\alpha_i) \pi_1(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi_1(\alpha_i) \pi_1(\alpha_k)) \times \\ \times N_{L/Q}(\pi_2(\alpha_i) \pi_2(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi_2(\alpha_i) \pi_2(\alpha_k)) > 0$$

pour chaque paire convenable (α_i, α_k) . On en déduit que

$$N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{[L:Q]} N_{L/Q}(\pi_1(\alpha_i) \pi_1(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi_1(\alpha_i) \pi_1(\alpha_k)) > 0$$

ou

$$N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) > 2^{[L:Q]} N_{L/Q}(\pi_2(\alpha_i) \pi_2(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi(\pi_2(\alpha_i) \pi_2(\alpha_k)) > 0$$

est vrai. Donc, d'après le lemme 7. ($S_2 = \emptyset$), on obtient $\overline{\pi_1(\alpha_i)}/\pi_1(\alpha_i) = \overline{\pi_1(\alpha_k)}/\pi_1(\alpha_k)$ ou $\overline{\pi_2(\alpha_i)}/\pi_2(\alpha_i) = \overline{\pi_2(\alpha_k)}/\pi_2(\alpha_k)$, c'est-à-dire $i \operatorname{Im} \pi_1(\alpha_i) \overline{\pi_1(\alpha_k)} = 0$ ou $i \operatorname{Im} \pi_2(\alpha_i) \overline{\pi_2(\alpha_k)} = 0$. Mais le produit

$$\pi_1(\alpha_i) \overline{\pi_1(\alpha_k)} \cdot \pi_2(\alpha_i) \overline{\pi_2(\alpha_k)} = f(\alpha_i) \overline{f(\alpha_k)} = \alpha \bar{\alpha} \neq 0$$

est réel, ainsi $\pi_1(\alpha_i) \overline{\pi_1(\alpha_k)}$ et $\pi_2(\alpha_i) \overline{\pi_2(\alpha_k)}$ sont simultanément réels. Vu que le graphe des paires (α_i, α_k) est connexe, il en résulte $\overline{\pi_j(\alpha_i)} = \varrho_j \pi_j(\alpha_i)$ ($j=1, 2$; $i=1, \dots, m$), d'où $\overline{\pi_j(x)} = \varrho_j \pi_j(x)$ ($j=1, 2$) d'après $m > \deg \pi_1, \deg \pi_2$ (voir la démonstration du lemme 8.). Mais c'est une contradiction d'après le lemme 9 et l'hypothèse.

Lemme 10. (CAPELLI [14]*). Soient $f(x)$ et $g(x)$ des polynômes normés à coefficients rationnels, soit $g(x)$ irréductible sur Q et soit α une de ses racines. Si $f(x) - \alpha = \pi_1^{k_1}(x) \dots \pi_r^{k_r}(x)$ est une décomposition en facteurs normés irréductibles sur $Q(\alpha)$, alors

$$(17) \quad g(f(x)) = \prod_{i=1}^r N_{Q(\alpha)/Q}^{k_i}(\pi_i(x))$$

est également une décomposition en facteurs irréductibles sur Q .

Il en résulte que le degré de chaque facteur irréductible de $g(f(x))$ est divisible par $\deg g$ et le nombre des facteurs irréductibles de $f(x) - \alpha$ sur $Q(\alpha)$ et de $g(f(x))$ sur Q est égal.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 1'. Vu que les corps de décomposition de $f_1(x)$ et $g(x)$ sont des K -corps, d'après le lemme 1. le corps de décomposition de $f_1(x)g(x)$, c'est-à-dire le corps L , est également un K -corps. Désignons par S_1 et S_2 toutes les continuations dans L des valuations p -adiques correspondant aux nombres premiers $p \in P_1$ et $p \in P_2$ respectivement. D'après le lemme 4 les éléments de S_1 et de S_2 sont tous „réels” et „non réels” respectivement.

Étant donné un nombre premier p et un entier $\beta \in L$, on a

$$(18) \quad |N_{L/Q}(\beta)|_p = \prod_{\substack{\varphi \\ \varphi(p) \neq 1}} \varphi(\beta),$$

*) Dans [14] on trouve une forme moins générale de ce théorème. *Addendum.* Dans le livre de L. Rédei (Algebra, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967) on trouve une forme plus générale du lemme 10.

où les valuations normées φ sont tous „réelles” ou bien „non réelles” d'après le lemme 4.

Soit $g(x) = \Pi(x - \alpha)$ et $F(x) = f(x) - \alpha$. Alors on a

$$\{g(0)\}^{\frac{2[L:Q]}{n}} = \{N_{Q(\alpha)/Q}\}^{\frac{2[L:Q]}{[Q(\alpha):Q]}} = N_{L/Q}^2(\alpha) = N_{L/Q}(\alpha\bar{\alpha}).$$

De (6) on déduit

$$\begin{aligned} N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{\varphi \in S_2} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) &= N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{p \in P_1} \left\{ \prod_{\substack{\varphi \\ \varphi(p) \neq 1}} \varphi^2(\alpha_i - \alpha_k) \right\} \times \\ \times \prod_{p \in P_2} \left\{ \prod_{\substack{\varphi \\ \varphi(p) \neq 1}} \varphi(\alpha_i - \alpha_k) \right\} &= N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \prod_{p \in P_1} |N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k)|_p \prod_{p \in P_2} |N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k)|_p > \\ &> \{2^n g^2(0) \prod_{p \in P_1} |g^2(0)|_p \prod_{p \in P_2} |g(0)|_p\}^{\frac{2[L:Q]}{n}} = 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(\alpha\bar{\alpha}) \times \\ \times \prod_{p \in P_1} |N_{L/Q}^2(\alpha\bar{\alpha})|_p \prod_{p \in P_2} |N_{L/Q}(\alpha\bar{\alpha})|_p &= 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(\alpha\bar{\alpha}) \prod_{p \in P_1} \left\{ \prod_{\substack{\varphi \\ \varphi(p) \neq 1}} \varphi^2(\alpha\bar{\alpha}) \right\} \times \\ \times \prod_{p \in P_2} \left\{ \prod_{\substack{\varphi \\ \varphi(p) \neq 1}} \max(\varphi(\alpha\bar{\alpha}), \varphi(\alpha\bar{\alpha})) \right\} &= 2^{2[L:Q]} N_{L/Q}^2(F(\alpha_i)F(\alpha_k)) \times \\ \times \prod_{\varphi \in S_1} \varphi^2(F(\alpha_i)F(\alpha_k)) \prod_{\varphi \in S_2} \max(\varphi(F(\alpha_i)\overline{F(\alpha_k)}), \varphi(\overline{F(\alpha_i)}F(\alpha_k))) &> 0 \end{aligned}$$

pour chaque paire considérée (α_i, α_k) . Si ces paires forment un graphe connexe à s éléments, alors d'après le théorème 1 $F(x) = f(x) - \alpha$ n'a aucun facteur irréductible de degré $< s$ sur L et par conséquent sur $Q(\alpha)$ non plus. Enfin, du lemme 10, il résulte que le degré de chaque diviseur irréductible de $g(f(x))$ est $\equiv s \deg g$, c'est-à-dire le nombre de ses diviseurs irréductibles est $\equiv \frac{\deg f}{s}$. Donc, en particulier, de $s > \frac{\deg f}{2}$ déduit que $g(f(x))$ est irréductible sur Q .

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2'. Elle s'obtient du théorème 2. (voir la démonstration précédente).

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 3. Vu que les nombres premiers $p \in P_1, P_2$ ne divisent pas

$$D^{[L:Q]}(f_1) = N_{L/Q}(D(f_1)) = \prod_{1 \leq k < i \leq \deg f_1} N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k),$$

on obtient $|N_{L/Q}(\alpha_i - \alpha_k)|_p = 1$ pour chaque paire (α_i, α_k) ($i \neq k$) de racines de $f_1(x)$. De (8) il résulte

$$N_{L/Q}^2(\alpha_i - \alpha_k) \equiv \{c(f_1)\}^{2[L:Q]} > 2^{2[L:Q]} \{g^2(0) \prod_{p \in P_1} |g^2(0)|_p \prod_{p \in P_2} |g(0)|_p\}^{\frac{2[L:Q]}{n}}.$$

Par conséquent le graphe de toutes les racines de $f_1(x)$ et connexe. En appliquant

maintenant le théorème 1', d'après l'hypothèse $\deg f_1 > \frac{\deg f}{2}$ il résulte l'irréductibilité de $g(f(x))$ sur Q . On peut prouver de la même façon la deuxième partie de notre théorème.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 4. Soient $a_1 < \dots < a_m$ les racines entières différentes de $f(x)$. D'après $m > \frac{\deg f}{2}$ on a $m > 4g^{2/n}(0) + 1$ ($n = \deg g$). Par conséquent il existe un nombre entier v tel que $2g^{2/n}(0) < v-1 < m-2g^{2/n}(0)$. Il en résulte

$$2g^{2/n}(0) < v-1 \leq a_v - a_1 < \dots < a_m - a_1,$$

et

$$2g^{2/n}(0) < m - (v-1) \leq a_m - a_{v-1} < \dots < a_m - a_1.$$

Désignons par L le corps de décomposition de $g(x)$. Alors pour les différences précédentes $a_i - a_k$ on a

$$|a_i - a_k|^{2[L:Q]} = N_{L/Q}^2(a_i - a_k) > \{2^n g^2(0)\}^{\frac{2[L:Q]}{n}}$$

et le graphe de ces paires (a_i, a_k) est connexe. En appliquant maintenant le théorème 1' dans la forme spéciale $P_1, P_2 = \emptyset$, nous obtenons l'irréductibilité de $g(f(x))$ sur Q .

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 5. Soient $a_1 < \dots < a_m$ et soit $a_m - a_1 = \max_{i,j} |a_i - a_j| > 4g^{1/n}(0)$. Alors on a $a_i - a_1$ ou $a_m - a_i \geq \frac{a_m - a_1}{2} > 2g^{1/n}(0)$ pour chaque $i (\neq 1, m)$. Par conséquent ils existent des paires (a_i, a_k) telles que $|a_i - a_k| > 2g^{1/n}(0)$, c'est-à-dire

$$|a_i - a_k|^{[L:Q]} = N_{L/Q}(a_i - a_k) > \{2^n g(0)\}^{\frac{[L:Q]}{n}}$$

et ces paires (a_i, a_k) forment un graphe connexe à m éléments. D'après le théorème 2' on en déduit l'irréductibilité de $g(f(x))$ sur Q . Si maintenant $g(x)$ est fixé et $\max_{i,j} |a_i - a_j| \leq 4g^{1/n}(0)$, alors on peut supposer que $0 \leq a_i \leq 4g^{1/n}(0)$ pour chaque i . Donc, du point de vue de l'irréductibilité de $g(f(x))$ il y a seulement un nombre fini d'exceptions essentiellement différentes et ces exceptions peuvent être déterminées.

Lemme 11. Soient $f(x)$ et $g(x)$ des polynômes satisfaisant aux conditions du théorème 5, et supposons que $g(0)=1$. S'ils existent des paires (a_i, a_k) des $a_1, \dots, a_m$ telles que $|a_i - a_k| > 2$ et si ces paires forment un graphe connexe ayant plus de $m/2$ éléments, alors $g(f(x))$ est irréductible sur Q .

DÉMONSTRATION. Ce lemme est un cas particulier du théorème 1', mais dans la suite il sera utilisé toujours dans cette forme.

Lemme 12. Si ε_1 et ε_2 sont des unités non réelles dans un K -corps et

$$(19) \quad \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 1,$$

alors on a nécessairement

$$(20) \quad \varepsilon_1 = \frac{1 - \zeta_2}{\zeta_1 - \zeta_2}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\zeta_1 - 1}{\zeta_1 - \zeta_2},$$

où chacun des $\zeta_1, \zeta_2 (\neq \zeta_1)$, ζ_1/ζ_2 est une racine d'unité primitive de degré p^x avec le même p^x (p nombre premier) ou bien aucune des degrés des racines d'unité $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_1/\zeta_2$ n'est une puissance de nombres premiers.

DÉMONSTRATION. Si ε_1 et ε_2 sont des solutions de (19) dans un K -corps, alors d'après le théorème du point 2 on peut écrire $\bar{\varepsilon}_1 = \zeta_1 \varepsilon_1$, $\bar{\varepsilon}_2 = \zeta_2 \varepsilon_2$ avec des racines d'unité ζ_1, ζ_2 . En effet, si dans le théorème nous choisissons $S = S_\infty$ et si, par exemple, $\varepsilon_1 \in \{V, U_s^\circ\}$, alors $\varepsilon_1 = \zeta_1 \varepsilon_0$ et $\bar{\varepsilon}_1 = \zeta_1^{-1} \varepsilon_0$ avec une racine d'unité ζ_1 et avec une unité réelle ε_0 . Par conséquent $\bar{\varepsilon}_1 = \zeta_1^{-2} \varepsilon_1$, où ζ_1^{-2} est une racine d'unité. Dans le cas contraire, si $\varepsilon_1 \notin \{V, U_s^\circ\}$, alors $\bar{\varepsilon}_1 \notin \{V, U_s^\circ\}$ et d'après $[U_s: \{V, U_s^\circ\}] \leq 2$ on a $\bar{\varepsilon}_1/\varepsilon_1 \in \{V, U_s^\circ\}$, c'est-à-dire $\bar{\varepsilon}_1 = \varepsilon_1 \zeta \varepsilon_0$ avec une racine d'unité ζ et avec une unité réelle ε_0 . Il en résulte $\varepsilon_1 = \bar{\varepsilon}_1 \zeta^{-1} \varepsilon_0$, d'où $\varepsilon_0 = \pm 1$ et $\bar{\varepsilon}_1 = \pm \zeta \varepsilon_1$, $\zeta_1 = \pm \zeta$. De plus de (19) on obtient $\bar{\varepsilon}_1 + \bar{\varepsilon}_2 = 1$ et il en résulte (20).

Soient maintenant $\zeta_1 = e^{2\pi i \frac{a_1}{q_1}}$, $(a_1, q_1) = 1$ et $\zeta_2 = e^{2\pi i \frac{a_2}{q_2}}$, $(a_2, q_2) = 1$ et prenons le corps $Q(\zeta_1, \zeta_2)$. Alors $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ sont des unités aussi dans $Q(\zeta_1, \zeta_2)$. En considérant la décomposition $x^{q_1 q_2} - 1 = \prod_{d|q_1 q_2} F_d(x)$ en polynômes cyclotomiques $F_d(x)$, on peut montrer par induction que $1 - \zeta_1$ et $1 - \zeta_2$ sont des unités simultanément si et seulement si aucun des q_1, q_2 n'est de la forme p^x . Pour que $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ soient des unités dans $Q(\zeta_1, \zeta_2)$ il faut et il suffit que $1 - \zeta_1, 1 - \zeta_2$ et $1 - \zeta_1/\zeta_2$ soient associés entre eux. Si $1 - \zeta_1, 1 - \zeta_2$ ne sont pas des unités, alors on a $q_1 = p^{x_1}, q_2 = p^{x_2}$ avec le même premier p , parce que dans le cas contraire on aurait $((1 - \zeta_1), (1 - \zeta_2)) = 1$ et $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ne seraient pas des unités. Si maintenant $x_1 < x_2$, alors on déduit $1 - \zeta_2 | 1 - \zeta_1$ et $1 - \zeta_1 \nmid 1 - \zeta_2$, ce qui est impossible. Donc, on a $x_1 = x_2 = x$. Enfin il faut que ζ_1/ζ_2 soit également une p^x -ième racine primitive de l'unité. Si $1 - \zeta_1, 1 - \zeta_2$ sont des unités simultanément, alors il faut que $1 - \zeta_1/\zeta_2$ soit également une unité, par conséquent dans ce cas aucun des degrés de $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_1/\zeta_2$ n'est une puissance de nombres premiers.

On peut aisément vérifier que dans ces cas les nombres $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ sont des unités non réelles dans le K -corps $Q(\zeta_1, \zeta_2)$ (et par conséquent dans tous les K -corps $L \supseteq Q(\zeta_1, \zeta_2)$) et ils satisfont à l'équation (19).

Lemme 13. Soit $\varepsilon = \frac{(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2)}{(\zeta_1 - \zeta_2)^2}$ avec des racines d'unité ζ_1, ζ_2 ($\zeta_2 \neq \zeta_1, \bar{\zeta}_1$) satisfaisant aux conditions du lemme 12. Alors $\zeta_1, \zeta_2 \in Q(\varepsilon)$ si et seulement s'il n'y a aucune q -ième racine d'unité primitive ζ telle que $\zeta_1 = \zeta^a, \zeta_2 = \zeta^b$, $(a, q) = (b, q) = 1$, $a^2 \equiv b^2 \pmod{q}$ et $q \neq p^x$ ($p \equiv 3$ nombre premier).

DÉMONSTRATION. ε étant non réel, $Q(\varepsilon)$ est un K -corps non réel et $\bar{\varepsilon} \in Q(\varepsilon)$, c'est-à-dire $\zeta_1 \zeta_2 = \frac{\bar{\varepsilon}}{\varepsilon} \in Q(\varepsilon)$. D'après $\varepsilon = \frac{1 - (\zeta_1 + \zeta_2) + \zeta_1 \zeta_2}{(\zeta_1 - \zeta_2)^2 - 4\zeta_1 \zeta_2}$ on a $[Q(\zeta_1 + \zeta_2): Q(\varepsilon)] \leq 2$ et $[Q(\zeta_1, \zeta_2): Q(\varepsilon)] \leq 4$.

Supposons que ζ_1 ou $\zeta_2 \notin Q(\varepsilon)$. Alors, il en résulte $[Q(\zeta_1, \zeta_2): Q(\varepsilon)] \geq 2$. Soit $\zeta_1 = e^{2\pi i \frac{a_1}{q_1}}$, $(a_1, q_1) = 1$ et $\zeta_2 = e^{2\pi i \frac{a_2}{q_2}}$, $(a_2, q_2) = 1$. Alors on peut écrire $Q(\zeta_1, \zeta_2) =$

$=Q(\zeta)$, où $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{q}}$, $q=[q_1, q_2]$ (voir, par exemple, S. Lang, Algebraic Number, New York—London, 1964.) Soit $a=a_1q_2(q_1, q_2)^{-1}$, $b=a_2q_1(q_1, q_2)^{-1}$ et $\zeta_1=\zeta^a$, $\zeta_2=\zeta^b$, où $a \not\equiv \pm b \pmod{q}$ par hypothèse. Considérons $\beta = \frac{1-\zeta^b}{\zeta^a-\zeta^b}$, $\gamma = \frac{\zeta^a-1}{\zeta^a-\zeta^b}$, où $-\gamma\beta=\varepsilon$. Nous montrons que β et γ sont des éléments primitifs dans $Q(\zeta)$. Dans le cas contraire on aurait $\beta = \frac{1-\zeta^b}{\zeta^a-\zeta^b} = \frac{1-\zeta^{lb}}{\zeta^{la}-\zeta^{lb}} = \beta^{(l)}$ pour un automorphisme $\zeta \rightarrow \zeta^l$, $(l, q)=1$, $l \not\equiv 1 \pmod{q}$ et il en résulterait $\frac{1-\zeta^{-b}}{\zeta^{-a}-\zeta^{-b}} = \frac{1-\zeta^{-lb}}{\zeta^{-la}-\zeta^{-lb}}$, d'où $\frac{\zeta^a(1-\zeta^b)}{\zeta^a-\zeta^b} = \frac{\zeta^{la}(1-\zeta^{lb})}{\zeta^{la}-\zeta^{lb}}$, c'est-à-dire $\zeta_1^{(l)}=\zeta^{la}=\zeta^a=\zeta_1$. Mais alors de $\beta=\beta^{(l)}$ on obtient $\zeta^a(\zeta^{lb}-\zeta^b) = \zeta^{lb}-\zeta^b$ et, d'après $\zeta_1=\zeta^a \neq 1$, $\zeta_2^{(l)}=\zeta^{lb}=\zeta^b=\zeta_2$. En appliquant l'automorphisme $\zeta \rightarrow \zeta^{(l)}$, tous les éléments de $Q(\zeta_1, \zeta_2)=Q(\zeta)$ seraient fixés. Par conséquent $l \equiv 1 \pmod{q}$ et β est primitif dans $Q(\zeta)$. On peut démontrer de la même manière que γ est également primitif dans $Q(\zeta)$. Vu que $\beta+\gamma=1$, on peut écrire le polynôme $x(x+1)-\varepsilon$ sous la forme

$$x(x+1)-\varepsilon = (x+\beta)(x+\gamma)$$

d'où

$$N_{Q(\zeta)/Q}^{[Q(\zeta):Q(\varepsilon)]}(x(x+1)-\varepsilon) = N_{Q(\zeta)/Q}(x(x+1)-\varepsilon) = N_{Q(\zeta)/Q}(x+\beta)N_{Q(\zeta)/Q}(x+\gamma).$$

Mais les polynômes $N(x+\beta)$ et $N(x+\gamma)$ sont irréductibles sur Q , par conséquent $N_{Q(\zeta)/Q}(x+\beta) = N_{Q(\zeta)/Q}(x+\gamma) = N_{Q(\varepsilon)/Q}(x(x+1)-\varepsilon)$ et $[Q(\zeta):Q(\varepsilon)]=2$. Il en résulte que β et γ sont conjugués entre eux sur Q , c'est-à-dire avec un automorphisme $\zeta \rightarrow \zeta^k$ ($k, q)=1$ on a

$$(21) \quad \beta = \frac{1-\zeta^b}{\zeta^a-\zeta^b} = \frac{\zeta^{ka}-1}{\zeta^{ka}-\zeta^{kb}} = \gamma^{(k)},$$

où $k \not\equiv 1 \pmod{q}$, parce que dans le cas contraire de $\beta+\gamma=1$ on obtiendrait $2\gamma=1$, mais γ est une unité dans $Q(\zeta)$ d'après le lemme 12. De (21) on déduit

$$\frac{1-\zeta^{-b}}{\zeta^{-a}-\zeta^{-b}} = \frac{\zeta^{-ka}-1}{\zeta^{-ka}-\zeta^{-kb}} \quad \text{et} \quad \frac{\zeta^a(1-\zeta^b)}{\zeta^a-\zeta^b} = \frac{\zeta^{kb}(\zeta^{ka}-1)}{\zeta^{ka}-\zeta^{kb}},$$

et finalement $\zeta^a=\zeta^{kb}$. D'après (21) on en conclut $\zeta^b(\zeta^a-1) = \zeta^{ka}(\zeta^a-1)$ et $\zeta^b=\zeta^{ka}$. Donc, on a

$$(22) \quad ak \equiv b \pmod{q} \quad \text{et} \quad bk \equiv a \pmod{q}$$

et par conséquent $(a, q)|b$ et $(b, q)|a$. Il en résulte

$$\left(\frac{a_1q_2}{(q_1, q_2)}, [q_1, q_2] \right) \left| \frac{a_2q_1}{(q_1, q_2)} \Rightarrow (a_1q_2, q_1q_2) \right| a_2q_1 \Rightarrow q_2(a_1, q_1) | a_2q_1 \Rightarrow q_2 | q_1$$

et de la même manière $q_1|q_2$, c'est-à-dire $q_1=q_2=q$, d'où $a=a_1$, $b=a_2$ et $(a, q)=(b, q)=1$. De (22) on obtient $k \equiv ba^{-1} \equiv ab^{-1} \pmod{q}$, d'où $a^2 \equiv b^2 \pmod{q}$. Enfin,

si $q = p^\alpha$ ($p \equiv 3$ nombre premier), alors $Q(\zeta)$ est cyclique et le corps réel $Q(\zeta + \zeta^{-1})$ est sous-corps unique de degré $[Q(\zeta):Q]/2$ dans $Q(\zeta)$. D'après $[Q(\zeta_1, \zeta_2):Q(\varepsilon)] = 2$ on en déduit $\varepsilon \in Q(\zeta + \zeta^{-1})$. Mais d'après $\zeta_2 \neq \bar{\zeta}_1$, ε n'est pas réel. Par conséquent $q \neq p^\alpha$ ($p \equiv 3$ nombre premier).

Réciproquement supposons que dans $\varepsilon = \frac{(1-\zeta_1)(1-\zeta_2)}{(\zeta_1-\zeta_2)^2}$ ($\zeta_2 \neq \zeta_1, \bar{\zeta}_1$) on a $\zeta_1 = \zeta^a$, $\zeta_2 = \zeta^b$ avec une racine d'unité ζ de degré $q \neq p^\alpha$ ($p \equiv 3$ nombre premier) telle que $(a, q) = (b, q) = 1$, $a^2 \equiv b^2 \pmod{q}$ et $a \not\equiv \pm b \pmod{q}$ d'après $\zeta_2 \neq \zeta_1, \bar{\zeta}_1$. Soit $k \equiv ba^* \pmod{q}$, où $aa^* \equiv 1 \pmod{q}$. Alors $(k, q) = 1$ et $k^2 \equiv 1 \pmod{q}$, mais $k \not\equiv \pm 1 \pmod{q}$. Considérons l'automorphisme non identique $\zeta \rightarrow \zeta^k = \zeta^{ba^*}$ dans $Q(\zeta)$. D'après $a^2 \equiv b^2 \pmod{q}$ on a

$$\varepsilon^{(k)} = \frac{(1-\zeta^{ka})(1-\zeta^{kb})}{(\zeta^{ka}-\zeta^{kb})^2} = \frac{(1-\zeta^b)(1-\zeta^a)}{(\zeta^b-\zeta^a)^2} = \varepsilon,$$

par conséquent ε n'est pas primitif dans $Q(\zeta)$, c'est-à-dire $[Q(\zeta):Q(\varepsilon)] \equiv 2$. Il en résulte que $\zeta_1, \zeta_2 \notin Q(\varepsilon)$. Avec cela notre lemme est démontré.

Lemme 14. Si ε_1 et ε_2 sont des unités non réelles dans un K -corps et

$$(23) \quad \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 2,$$

alors on a nécessairement

$$(24) \quad \varepsilon_1 = 1 - \zeta, \quad \varepsilon_2 = 1 + \zeta$$

où ζ est une racine d'unité et son degré $\neq p^\alpha$, $2p^\alpha$ (p nombre premier, $\alpha \geq 0$).

DÉMONSTRATION. Si ε_1 et ε_2 sont des solutions de (23) et $\bar{\varepsilon}_1 = \zeta_1 \varepsilon_1$, $\bar{\varepsilon}_2 = \zeta_2 \varepsilon_2$, alors on en déduit que $\varepsilon_1 = \frac{2(1-\zeta_2)}{\zeta_1-\zeta_2}$, $\varepsilon_2 = \frac{2(\zeta_1-1)}{\zeta_1-\zeta_2}$, $\zeta_1 \neq \zeta_2$ (voir la démonstration du lemme 12). De plus on a nécessairement $2|(\zeta_1-\zeta_2)|(1-\zeta_1/\zeta_2)$, c'est-à-dire $N_{Q(\zeta_1, \zeta_2)/Q}(2) | N_{Q(\zeta_1, \zeta_2)/Q}(1-\zeta_1/\zeta_2)$, d'où il résulte $\zeta_2 = -\zeta_1$ et finalement (24) avec des unités $(1+\zeta)$ et $(1-\zeta)$. On en conclut (voir aussi la démonstration du lemme 12) que le degré de ζ n'est pas de la forme p^α ou $2p^\alpha$ (p nombre premier).

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 6. Pour $m > 5$ notre proposition s'obtient du théorème 5.

Dans la suite nous supposons que $a_1 < \dots < a_m$. Dans le cas $m=5$ $g(f(x))$ est irréductible d'après $a_5 - a_1 > a_4 - a_1 > 2$ et le lemme 11.

Soit ensuite $m=4$. Si les entiers a_1, a_2, a_3, a_4 ne sont pas consécutifs, alors $a_4 - a_1 \equiv 4$, $a_3 - a_1$ ou $a_4 - a_2 > 2$ et il en résulte également notre proposition. Dans le cas contraire on peut prendre $a_1 = -1$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$, $a_4 = 2$. Si $g(f(x))$ est réductible sur Q , alors $f(x) - \varepsilon$ est également réductible sur $Q(\varepsilon) = L$, c'est-à-dire on peut écrire

$$(25) \quad f(x) - \varepsilon = (x+1)x(x-1)(x-2) - \varepsilon = \pi_1(x)\pi_2(x)$$

avec des polynômes à coefficients entiers $\pi_1(x), \pi_2(x)$ sur L . D'après les lemmes 8 et 9 on a nécessairement $\deg \pi_1, \deg \pi_2 > 1$, c'est-à-dire $\pi_1(x) = x^2 + \beta x + \gamma$, $\pi_2(x) = x^2 + \delta x + \sigma$. Les $\pi_1(a_i) = \varepsilon_i$ sont des unités, par conséquent on peut écrire $\varepsilon_i = \zeta_i \varepsilon_i$

avec des racines d'unité ζ_i dans L . En appliquant le lemme 7, de $a_4 - a_1 > 2$ il résulte $\zeta_4 = \zeta_1$. De plus, de $a_3 - a_1 = 2$ on déduit $2|\pi_1(a_3) - \pi_1(a_1)| = \varepsilon_3 - \varepsilon_1$ et $2|\bar{\varepsilon}_3 - \bar{\varepsilon}_1| = \zeta_3 \varepsilon_3 - \zeta_1 \varepsilon_1$, c'est-à-dire $2|\zeta_3 - \zeta_1|$. En prenant maintenant les normes de ces nombres, on conclut $\zeta_3 = -\zeta_1$ et $\zeta_2 = -\zeta_4 = -\zeta_1$. Considérons l'égalité

$$-\pi_1(a_1) + 3\pi_1(a_2) - 3\pi_1(a_3) + \pi_1(a_4) = -\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 + \varepsilon_4 = 0$$

et prenons son conjugué complexe. Alors nous obtenons

$$-\varepsilon_1 - 3\varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 + \varepsilon_4 = 0$$

et finalement $\varepsilon_1 = \varepsilon_4$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3$. Donc, on a $\pi_1(-1) = \pi_1(2)$, $\pi_1(0) = \pi_1(1)$, d'où $\beta = -1$ et de la même manière $\delta = -1$. De (25) on déduit

$$\gamma + \sigma = -2, \quad \gamma\sigma = -\varepsilon.$$

Par conséquent $-\gamma$, $-\sigma$ sont des unités non réelles satisfaisant à l'équation (23). En conséquence du lemme 14 on a $-\gamma = 1 + \zeta$, $-\sigma = 1 - \zeta$ et finalement $\varepsilon = \zeta^2 - 1$ avec une racine d'unité satisfaisant au lemme 14. Mais $\zeta \in Q(\varepsilon) = Q(\zeta^2)$ si et seulement si le degré ζ est n ou $2n$, $n > 1$ étant impaire. Dans ces cas $g(f(x))$ est réductible sur Q .

Supposons ensuite que $m=3$ et

$$(26) \quad f(x) - \varepsilon = (x + \beta)(x^2 + \gamma x + \delta)$$

avec des polynômes à coefficients entiers sur $Q(\varepsilon) = L$. Si les entiers $a_1 < a_2 < a_3$ ne sont pas consécutifs, alors d'après les lemmes 8 et 9 $a_3 - a_1 > 2$ entraîne une contradiction. Dans le cas contraire on peut prendre $a_1 = -1$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$. Maintenant de (26) il résulte

$$\beta + \gamma = 0, \quad \beta\gamma + \delta = -1, \quad \beta\delta = -\varepsilon,$$

c'est-à-dire

$$\varepsilon = \beta(1 - \beta)(1 + \beta).$$

Par conséquent β , $1 - \beta$ et $1 + \beta$ sont des unités non réelles dans L telles que $\beta + (1 - \beta) = 1$ et $(1 - \beta) + (1 + \beta) = 2$. Donc, d'après les lemmes 12 et 14 on peut déterminer β et ε , par exemple $\beta = \zeta$, $\varepsilon = \pm(\zeta - \zeta^3)$, ζ étant une racine d'unité convenablement choisie. Mais dans ces cas les conjugués de $\zeta - \zeta^3$ sont différents dans $Q(\zeta)$, par conséquent $\zeta \in Q(\varepsilon)$ et ainsi on obtient les décompositions de la forme (26) dans $Q(\varepsilon)$, c'est-à-dire les polynômes exceptionnels.

Enfin, si $m=2$ et $f(x) - \varepsilon$ est réductible sur $Q(\varepsilon)$, alors on peut écrire

$$(27) \quad f(x) - \varepsilon = (x + \beta)(x + \gamma)$$

où β et γ sont des nombres non réels dans $Q(\varepsilon)$. Dans le cas $a_2 - a_1 > 2$ on obtient une contradiction d'après les lemmes 8 et 9. Dans le cas $a_2 - a_1 = 2$ on peut prendre $a_1 = -2$, $a_2 = 0$. De (27) on déduit

$$\beta + \gamma = 2, \quad \beta\gamma = -\varepsilon$$

avec des unités β , γ non réelles. Par conséquent, d'après le lemme 14 $\beta = 1 - \zeta$, $\gamma = 1 + \zeta$ et $\varepsilon = \zeta^2 - 1$ avec une racine d'unité primitive de degré $\neq p^2$, $2p^2$ (p nombre premier, $\alpha \geq 0$). Mais (voir le cas $m=4$) $\zeta \in Q(\varepsilon) = Q(\zeta^2)$ si et seulement si le degré

de ζ est n ou $2n$, $n > 1$ étant impaire. Il en résulte que $n \neq p^*$ ($p \geq 3$ nombre premier). Enfin, si l'on a $a_2 - a_1 = 1$, par exemple $a_2 = 0$, $a_1 = -1$, alors de (27) il résulte

$$(28) \quad \beta + \gamma = 1, \quad \beta\gamma = -\varepsilon.$$

D'après le lemme 12 on a nécessairement

$$\beta = \frac{1 - \zeta_2}{\zeta_1 - \zeta_2}, \quad \gamma = \frac{\zeta_1 - 1}{\zeta_1 - \zeta_2}$$

et

$$\varepsilon = \frac{(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2)}{(\zeta_1 - \zeta_2)^2}$$

avec des racines d'unité ζ_1, ζ_2 , déterminées dans le lemme 12. Vu que ε est non réel, on a $\bar{\zeta}_2 \neq \zeta_1$. De plus par hypothèse $\beta, \gamma \in Q(\varepsilon)$. Mais $Q(\varepsilon)$ est un K -corps, ainsi $\bar{\beta}, \bar{\gamma} \in Q(\varepsilon)$, d'où on déduit $\zeta_1 = \frac{\bar{\beta}}{\beta}, \zeta_2 = \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} \in Q(\varepsilon)$. Par conséquent, d'après le lemme 13 il n'existe pas de racine d'unité ζ de degré $q \neq p^*$ ($p \geq 3$ nombre premier) telle que $\zeta_1 = \zeta^a, \zeta_2 = \zeta^b, (a, q) = (b, q) = 1, a^2 \equiv b^2 \pmod{q}$. Il en résulte que ε satisfait aux conditions du théorème.

Supposons ensuite que $\varepsilon = \frac{(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2)}{(\zeta_1 - \zeta_2)^2}$ avec des racines d'unité ζ_1, ζ_2 satisfaisant aux conditions du théorème (le cas $m=2$). Alors

$$\beta = \frac{1 - \zeta_2}{\zeta_1 - \zeta_2}, \quad \gamma = \frac{\zeta_1 - 1}{\zeta_1 - \zeta_2}$$

sont des unités non réelles dans $Q(\zeta_1, \zeta_2)$ d'après le lemme 12. De plus, d'après le lemme 13 on a $\zeta_1, \zeta_2 \in Q(\varepsilon)$, c'est-à-dire $\beta, \gamma \in Q(\varepsilon)$. Par conséquent il existe la décomposition $x(x+1) - \varepsilon = (x+\beta)(x+\gamma)$ dans $Q(\varepsilon)$, et si $g(\varepsilon) = 0$, alors $g(x(x+1))$ est réductible sur Q .

Bibliographie

- [1] A. BRAUER—R. BRAUER und H. HOPF, Über die Irreduzibilität einiger spezieller Klassen von Polynomen, *Jber. Deutsch. Math. Verein.* **35** (1926), 99—112.
- [2] A. BRAUER—R. BRAUER, Über Irreduzibilitätskriterien von I. Schur und G. Pólya, *Math. Z.* **40** (1936), 242—265.
- [3] H. L. DORWART—O. ORE, Criteria for the irreducibility of polynomials, *Annals of Math.* **34** (1933), 81—94.
- [4] W. FLÜGEL, Lösung der Aufgabe 226, *Archiv. der Math. und Phys.* **15** (1909), 271—272.
- [5] K. GYÖRY—L. LOVÁSZ, Representation of integers by norm-forms II, *Publ. Math. Debrecen* **17** (1970), 173—181.
- [6] K. GYÖRY, Sur une classe des corps algébrique et ses applications, *sous presse*.
- [7] H. ILLE, Einige Bemerkungen zu einem von G. Pólya herrührenden Irreduzibilitätskriterium, *Jber. Deutsch. Math. Verein.* **35** (1926), 204—208.
- [8] G. PÓLYA, Verschiedene Bemerkungen zur Zahlentheorie, *Jber. Deutsch. Math. Verein.* **28** (1919), 31—40.
- [9] G. PÓLYA und G. SZEGŐ, Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis, Band II, *Berlin* 1964.
- [10] I. SCHUR, Aufgabe 275, 259, *Archiv der Math. und Physik*, **15** (1909).

- [11] I. SERES, Lösung und Verallgemeinerung eines Schurschen Irreduzibilitätsproblems für Polynome, *Acta Math. Acad. Sci. Hung.* (1956), 151—157.
- [12] I. SERES, Irreducibility of polynomials, *J. Algebra*, **2** (1965), 283—286.
- [13] I. SERES, Über die Irreduzibilität gewisser Polynome, *Acta Arithmetica* **8** (1963), 321—341.
- [14] N. TSCHEBOTARÖW—H. SCHWERTFEGER, Grundzüge der Galois'schen Theorie, *Gröningen—Djakarta*, 1950.
- [15] U. WEGNER, Über die Irreduzibilität einer Klasse von ganzen rationalen Funktionen, *Jber. Deutschen Math. Verein.* **40** (1931), 239—241.

(Reçu le 3 janvier 1970.)